
**WETENSCHAPPELIJKE NAAM**

Echinorhinus brucus (Bonnaterre 1788).

VERSPREIDING

Wereldwijd voorkomend, maar onregelmatig verspreid. Noordoost-Atlantische Oceaan: Noordzee tot Ivoorkust, ook in Middellandse Zeeⁱ.

**LOKALE NAMEN**

BRAAMHAAI, Braamdoornhaai, Bramble Shark (UK), Squalé Boucl'e (Fr), Tiburón de Clavos (Es).

KENMERKEN

- 1 Grote, stekelachtige huidtanden verspreid over het gehele lichaam.
- 2 Rugvinnen vlakbij elkaar zonder stekels.
- 3 No anal finⁱ.


KLEUR

- Rugzijde zwart tot grijs, bruin, paars tot olijfgroen.
- Rugzijde en flanken met metaalachtige reflecties.
- Buikzijde bruin, grijs tot witⁱ.
- Kan donkere of rode vlekken hebben op de rugzijde en flanken.

BIOLOGIE EN GROOTTE

- Bij geboorte: 40–50cmⁱ. Bij geslachtsrijpheid: 200cm ♀, 160cm ♂ⁱⁱⁱ. Max TL: 310cmⁱ.
- Worpen met 15–24 jongen zijn gemeldⁱ.
- Eet diverse soorten beenvissen, kreeftachtigen, haaien en roggenⁱⁱ.

TANDEN




- Gelijkaardige tanden in beide kaken.
- Enkele punt met 0–3 bijspitsen. Juvenielen geen bijspitsen.
- 20–26 tanden in bovenkaak, 22–26 in onderkaakⁱⁱ.

GELIJKAARDIGE SOORTEN




- *Echinorhinus brucus*, **Braamhaai**



- *Somniosus microcephalus*, **Groenlandse Haai**



- *Somniosus rostratus*, **Lemargo**



- *Hexanchus griseus*, **Grauwe Haai**

HABITAT

- 18–900m, voornamelijk dieper dan 200 mⁱ.
- Gewoonlijk op of nabij de bodem, maar ook aangetroffen in de waterkolom.
- Beschouwd als een logge haai, maar in staat tot korte versnellingen om prooi te vangenⁱⁱⁱ.

BESCHERMINGSSTATUS

- Zeldzame diepwatersoort, sporadisch aangetroffen, gewoonlijk alleen. Weinig bekend over levenscyclus, maar waarschijnlijk laat geslachtsrijp, trage groei en met weinig jongenⁱⁱⁱ.
- **Status op de Rode Lijst:** DD - Onvoldoende data (2003)ⁱⁱⁱ. EN - Bedreigd in Europese wateren (2015)^{iv}.

COMMERCEEL BELANG

- Relatief onbelangrijk. Bijvangst bij sleepnet- en hengeltvisserij.
- Gewoonlijk overboord gegooit, maar in het geval van aanlanding gebruikt voor vismeel.
- Leverolie als traditioneel medicijn gebruikt in Zuid-Afrikaⁱⁱ.

HANTEREN

- Voorzichtig hanteren.
- Grote, stekelachtige huidtanden verspreid over het lichaam.
- Scherpe tanden.

REFERENTIES

- Bester, C. *et al*; Unknown. FLMNH.
- Compagno, L. J. V; 1984. FAO.
- Paul, L; 2003. IUCN Red List.
- Nieto, A. *et al*; 2015. European Red List of Marine Fishes.

HUIDTANDEN

